

"Одобрено"
Фармакологическим Комитетом
МИНЗДРАВА РОССИИ
«13» ноя 2000г.
пр. № 10

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
СТОПТУССИН
(Stoptussin)

Регистрационный номер:

Торговое (патентованное) название препарата - СТОПТУССИН

Международное непатентованное название - нет

Лекарственная форма - капли для приема внутрь

Состав препарата: 10 мл раствора содержат
активные компоненты- Гвайфенизин 1,0 г, бутамирата дигидрогеноцитрат 0,04 г
вспомогательные вещества: этанола 95% 3,0 г, полисорбит 80 0,01 г,
пропиленгликоль до 10 мл.

Описание: Прозрачная вязкая жидкость, от желтого до желто-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: противокашлевое, муколитическое и отхаркивающее средство.

Фармакологические свойства:

Комбинированный препарат, оказывающий противокашлевое, муколитическое и отхаркивающее действие. Входящий в состав препарата бутамирата дигидроцитрат обладает периферическим местноанестезирующим действием на рецепторы бронхов, что обеспечивает противокашлевой эффект. Кроме того, он обладает умеренным бронхолитическим эффектом. Гвайфенизин снижает вязкость мокроты и тем самым улучшает ее отхождение.

Показания к применению

Сухой, раздражающий кашель (в том числе при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних и нижних отделов дыхательных путей).

Противопоказания:

- гиперчувствительность к составляющим препарат компонентам,
- миастения,
- первый триместр беременности.

Способ применения и дозы:

Доза препарата зависит от массы тела пациента:

до 7 кг	по 8 капель 3 - 4 раза в сут.
7 - 12 кг	по 9 капель 3 - 4 раза в сут.
12 - 20 кг	по 14 капель 3 раза в сут.
20 - 30 кг	по 14 капель 3 - 4 раза в сут.
30 - 40 кг	по 16 капель 3 - 4 раза в сут.
40 - 50 кг	по 25 капель 3 раза в сут.
50 - 70 кг	по 30 капель 3 раза в сут.
70 - 90 кг	по 40 капель 3 раза в сут.

Соответствующее количество капель растворяют в 100 мл жидкости (вода, чай, фруктовый сок); принимать желательнее после еды.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препараты лития и магния усиливают действие гвайфенезина. Одновременное назначение гвайфенезина с парацетамолом или ацетилсалициловой кислотой повышает анальгетический эффект последних. Гвайфенезин усиливает действие алкоголя, седативных, снотворных средств и общих анестетиков на ЦНС, усиливает действие миорелаксантов.

Беременность и лактация

Беременным женщинам препарат назначается только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает любой возможный риск для плода. Учитывая отсутствие данных по выделению препарата в материнское молоко, назначение Стоптуссина в период лактации возможно только в том случае, если польза для матери оправдывает потенциальный риск для ребенка.

Побочное действие :

При соблюдении рекомендуемой дозировки пациенты переносят препарат хорошо. Гвайфенезин может в редких случаях вызывать тошноту, рвоту, понос, боли в желудке, головокружение, головную боль, крапивницу и кожную сыпь.

Передозировка

При передозировке преобладают признаки токсического воздействия гвайфенезина. К этим признакам относятся сонливость, тошнота и рвота. Против гвайфенезина нет специфического антидота. Мероприятия в случае передозировки - промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Форма выпуска

10 мл раствора в стеклянном флаконе с крышечкой-капельницей помещенные в картонный пенал с инструкцией по применению.

Условия хранения : Препарат хранить при температуре от 10°C до 25°C, в защищенном от света месте. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет. Не использовать после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта врача.

Изготовитель:

Галена А. О.
Оставска 29
747 70 Опава - Комаров
Чешская Республика.

