

Инструкция
по медицинскому применению
препарата ДИКЛОНАТ® П

Регистрационное удостоверение _____

Торговое название препарата: ДИКЛОНАТ® П

Международное непатентованное название: Диклофенак

Лекарственная форма: гель для наружного применения.

Состав:

1 г содержит активное вещество - натрия диклофенака 10 мг и вспомогательные вещества: карбомер 934, цетомакрогол, цетиол, раствор аммония 25%, изопропиловый спирт, жидкий парафин, пропиленгликоль, ароматизатор лаванда, вода очищенная.

Описание: белая полупрозрачная кремоподобная масса с запахом лаванды и изопропилового спирта.

Фармакологическая группа: нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП)

Код АТХ: M02AA15

Фармакологические свойства

Активный компонент диклофенак - нестероидный противовоспалительный препарат, обладающий выраженными анальгезирующими и противовоспалительными свойствами. Незыблительно угнетая циклооксигеназу 1 и 2 типа, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты и синтез простагландинов, являющихся основным звеном в развитии воспаления.

Диклонат®П используют для устранения болевого синдрома и уменьшения отечности, связанной с воспалительным процессом.

При рекомендуемом способе нанесения препарата абсорбируется около 6% от нанесенной дозы препарата.

Показания к применению

- Травматическое повреждение сухожилий, связок, суставов.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, ревматические поражения мягких тканей.
- Мышечные боли ревматического и неревматического происхождения.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к диклофенаку и другим компонентам препарата, ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным препаратам;
- "аспириновая" астма;
- беременность (III триместр);
- период лактации;
- детский возраст (до 12 лет);
- нарушение целостности кожных покровов.

С осторожностью: печеночная порфирия (обострение), эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, тяжелые нарушения функции печени и почек, хроническая сердечная недостаточность, бронхиальная астма, пожилой возраст, детский возраст, беременность I и II триместр.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат нельзя применять в III триместре беременности. Опыта применения препарата в период лактации не имеется. Использование в I и II триместрах возможно только после консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Взрослым и детям старше 12 лет препарат наносят на кожу 3-4 раза в день и слегка втирают. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. Разовая доза препарата - 2-4 г (4-8 см при полностью открытой горловине тубы). Продолжительность лечения без консультации врача не должна превышать 10 дней.

Побочное действие

Местные реакции: экзема, фотосенсибилизация, контактный дерматит (зуд, покраснение, отечность обрабатываемого участка кожи, папулы, визикулы, шелушение).

Системные реакции: генерализованная кожная сыпь, аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек, бронхоспастические реакции), фотосенсибилизация.

Не исключается возможность развития системных побочных эффектов диклофенака при нанесении геля на большие площади кожи в течение длительного периода времени.

Передозировка.

Крайне низкая системная абсорбция активного компонента препарата при наружном применении делает передозировку практически невозможной.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Диклофенак может усиливать действие препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию.

Клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными препаратами не описано.

Особые указания.

Диклонат ®П следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. После нанесения не следует накладывать окклюзионную повязку.

Окклюзия в течение 10 часов может приводить к 3-х кратному увеличению абсорбции диклофенака.

Не следует допускать попадания препарата на глаза и слизистые оболочки.

Форма выпуска

По 60 г геля в алюминиевую тубу.

По 1 тубе вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

- при температуре не выше 25°C;

- хранить в местах, удаленных от детей!

Срок годности

2 года

Не использовать препарат по истечению срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

без рецепта

Название и адрес фирмы-производителя:

«ПЛИВА ХРВАТСКА д.о.о.»,
Загреб, Республика Хорватия


Представительство в РФ: Москва, Новочеремушкинская

Представитель фирмы

Садовникова С.Ф.

Директор ИДКЭЛС

Профессор



Чельцов В.В.