

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

САНОРИН (SANORIN)

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Санорин.

Международное непатентованное название препарата: Нафазолин.

Лекарственная форма: капли назальные.

Состав: 10 мл препарата содержат

Активное вещество

Нафазолина нитрат 0,005 г (0,05% р-р) и 0,01 г (0,1% р-р).

Вспомогательные вещества

Кислота борная, этилендиамин, метилпарабен, вода стерильная.

Описание

Прозрачная, бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Противоконгестивное средство – вазоконстриктор (альфа-адреномиметик).

Код АТХ: R01AA08.

Фармакологические свойства

Нафазолин относится к альфа₂-адреномиметикам, оказывает быстрое, выраженное и продолжительное сосудосуживающее действие в отношении сосудов слизистых оболочек (уменьшает отечность, гиперемию, экссудацию). Облегчает носовое дыхание при ринитах. Через 5-7 дней возникает толерантность.

Показания к применению

острый ринит,
синусит,
евстахиит,
ларингит,
для облегчения проведения риноскопии,

необходимость остановки носовых кровотечений,
в качестве дополнительного средства при лечении конъюнктивитов бактериального происхождения.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата,
хронический ринит,
закрытоугольная глаукома,
артериальная гипертензия,
выраженный атеросклероз,
тахикардия,
тиреотоксикоз,
сахарный диабет,
одновременный прием ингибиторов МАО и период до 14 дней после окончания их применения,
Санорин 0,05% раствор противопоказан детям до 2 лет,
Санорин 0,1% раствор противопоказан детям до 15 лет.

Способ применения и дозы

Дозы для взрослых:

По 1-3 капли 0,1% раствора Санорина в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки.

Дозы для детей:

1-2 капли 0,05% раствора Санорина в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки с интервалом не менее чем 4 часа.

Применять кратковременно, не более 1 недели у взрослых и не более 3-х дней у детей. Если носовое дыхание облегчается, то применение Санорина можно закончить раньше. Повторное применение препарата возможно через несколько дней.

В случае носового кровотечения можно поместить в носовой ход ватный тампон, смоченный 0,05% раствором Санорина.

В глаза закапывают по 1-2 капли 0,05% раствор Санорина в конъюнктивальный мешок 3-4 раза в сутки.

Побочное действие

Тошнота, тахикардия, головная боль, раздражительность, аллергические реакции, сыпь, повышение артериального давления, реактивная гиперемия, набухание слизистой оболочки носовой полости.

Местный побочный эффект: при применении более 1 недели – раздражение, в некоторых случаях - отек слизистой оболочки носа.

Передозировка

Длительное или частое применение Санорина в носовую полость может вызвать набухание слизистой оболочки носа и ощущение его заложенности. Опасность передозировки (особенно в случае проглатывания) Санорина возникает у детей младшего возраста и может вызвать угнетение центральной нервной системы со следующей симптоматикой: сонливость, понижение температуры тела, повышение потоотделения, замедление частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления или его последующее понижение, крайне редко возможна кома.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Одновременный прием с ингибиторами МАО и период до 14 дней после окончания их применения, повышает риск развития выраженной артериальной гипертензии (высвобождение депонированных катехоламинов под действием нафазолина).

Замедляет всасывание местноанестезирующих средств.

Особые указания

При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи с чем рекомендуется через 5-7 дней применения у взрослых и через 3 дня применения у детей сделать перерыв на несколько дней.

Может оказывать резорбтивное действие.

О целесообразности применения Санорина с другими лекарственными средствами посоветуйтесь с врачом.

Форма выпуска

По 10 мл препарата в стеклянные флаконы из стекла коричневого цвета, снабженные капельницей с пробкой из полиэтилена. Каждый флакон помещен в картонную пачку с инструкцией по применению.

Срок годности

4 года

Условия хранения

Хранить при температуре от 10°C до 25°C, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель


АЙВЭКС Фармасьютикалс с.р.о., Чешская Республика

Входит в состав IVAX Corporation

Московское представительство:

Москва, Дмитровский пер., дом 9, тел: (095) 234 9713

Директор ИДКЭЛС, профессор



В.В.Чельцов

Представитель фирмы

