

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Департамента Государственного
контроля лекарственных средств и
медицинской техники МЗ РФ


Акимочкин В.Е.

12.05.2003

ОДОБРЕНО

Фармакологическим комитетом
МЗ РФ

«13» мая 2003 г

Протокол № 2

ИНСТРУКЦИЯ
(информация для потребителей)
по медицинскому применению препарата
СТОПАНГИН

Регистрационный номер:

Торговое название: СТОПАНГИН

Лекарственная форма: спрей для местного применения

Состав:

Активные вещества: гексетидин 57,7 мг; смесь эфирных масел (анисовое эфирное масло 14 мг, эвкалиптовое эфирное масло 0,4 мг, эфирное масло из цветков апельсинового дерева 3,3 мг, сассифрасное эфирное масло 3,3 мг, эфирное масло мяты перечной 23,1 мг); ментол 6,7 мг; метилсалицилат 6,7 мг.

Вспомогательные вещества: сахаринат натрия моногидрат, глицерин 85%; этанол 96%.

Описание: прозрачная, бесцветная или почти бесцветная жидкость со специфическим запахом. После распыления образуется тонко распыленная аэрозоль.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ: R02AA20

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Антисептическое средство для местного применения. Обладает также противогрибковой активностью и анальгетическими свойствами при нанесении на слизистую оболочку. Стопангин оказывает обволакивающее действие. Эффект продолжается 10 - 12 час.

ПОКАЗАНИЯ

- воспалительные заболевания полости рта и гортани (ангина, тонзиллит, фарингит, стоматит, афты, глоссит, пародонтоз и пародонтопатии, инфицирование альвеол);
- грибковые заболевания полости рта и гортани (молочница);
- до и после оперативных вмешательств, а также травмах полости рта и гортани;
- в качестве вспомогательного средства при комплексном лечении ангин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат не следует применять при повышенной чувствительности к компонентам препарата, при сухом фарингите атрофического типа, детям в возрасте до 8 лет, а также во время беременности (1 триместр).

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Может появиться временное ощущение жжения слизистой ротовой полости после применения препарата, которое самопроизвольно быстро исчезает. В исключительных случаях у людей с повышенной чувствительностью может наступить аллергическая реакция. В случае появления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Не известны.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Местно. Снять защитный колпачок и присоединить аппликатор. Нажать 2-3 раза, для того чтобы раствор поступил в распылитель. Затем задержать дыхание и прыснуть на каждую из миндалин.

