

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

СТОПТУССИН-ФИТО

Регистрационный номер:

Торговое название препарата
СТОПТУССИН-ФИТО ✓

Лекарственная форма
Сироп ✓

Состав

100 г сиропа содержат:

Активные компоненты:

Тимьяна экстракт жидкий	4,1666 г ✓
Чабреца экстракт жидкий	4,1666 г ✓
Подорожника экстракт жидкий	4,1666 г ✓

Вспомогательные вещества: мёд очищенный, натрия бензоат, пропилпарабен, сахараза, вода очищенная.

Описание

Густой прозрачный сироп коричневого цвета с тимьяновым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05CA10

Фармакологические свойства

Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное действие, способствует снижению вязкости мокроты.

Показания к применению

В составе комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит, трахеобронхит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, декомпенсация сердечной деятельности, заболевания печени и почек, детский возраст до 1 года, врожденная непереносимость фруктозы, нарушение усвоения глюкозы и галактозы; недостаток энзима, расщепляющего сахарозу и изомальтозу.

С осторожностью (вследствие наличия этанола в препарате): алкоголизм, эпилепсия, заболевания и травмы головного мозга.

Способ применения и дозы

Препарат назначается внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита)

Детям от 1 года до 5 лет – по ½-1 чайной ложке 2-3 раза в день, от 5 до 10 лет - по 1-2 чайные ложки 3 раза в день, от 10 до 15 лет – по 2-3 чайные ложки 3 раза в день, детям старше 15 лет и взрослым - по 1 столовой ложке 3-5 раз в день.

Средний курс лечения – 7 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Стоптуссин-Фито не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат содержит 3,4 % (объемн.) этанола; 1 чайная ложка (5 мл) содержит до 0,14 г этанола; 1 столовая ложка (15 мл) – до 0,41 г этанола.

Препарат следует с осторожностью назначать детям (из-за возможного негативного влияния этанола).

В составе препарата содержится 62% сахарозы, поэтому его следует с осторожностью применять больным сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. В 1 чайной ложке препарата содержится до 3.1 г сахарозы, в 1 столовой ложке – до 9,3 г сахарозы.

Форма выпуска ✓

Сироп; по 100 мл во флаконах темного стекла с мерным колпачком. Каждый флакон помещен вместе с инструкцией по применению в картонную коробку.

Условия хранения ✓

При температуре от 10 до 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года ✓

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

АЙВЭКС Фармасьютикалс с.р.о., Чешская Республика

Czech Republic

Opava 7

Ostravska 29, 74770

Tel 420-553-64-11-11

Представительство в Москве

103031, г. Москва,

Дмитровский пер., 9

Бизнес-Центр «Столешники», 5 этаж

т (095) 234 9713

Директор ИДКЭЛС
профессор

В.В.Чельцов

Представитель фирмы

