

ИНСТРУКЦИЯ
(информация для потребителей)
по медицинскому применению препарата
ЙОКС®
(JOX®)

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: ЙОКС®

Международное непатентованное название или группировочное название:

Повидон-йод + Аллантоин&

Лекарственная форма: спрей для местного применения

Состав

Активные вещества:

Повидон-йод 2,550 г и аллантоин 0,030 г на 30 мл.

Вспомогательные вещества:

левоментол, кислота лимонная моногидрат, натрия цитрат дигидрат, этанол 96 %, пропиленгликоль, вода очищенная.

Описание

Прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость красно-коричневого цвета, неограниченно смешиваемая с водой.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ: A01AD; R02AA15

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат для местного применения при заболеваниях полости рта и ЛОР-органов. При контакте с кожей или слизистыми оболочками выделяет йод; оказывает антисептическое и противовоспалительное действие.

Препарат обладает широким спектром противомикробного действия.

Активен в отношении бактерий, грибов, вирусов, простейших.

Показания к применению

1. Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки: в том числе ангины, тонзиллиты, тонзилофарингиты, глосситы, стоматиты, афты;
2. Для обработки полости рта и глотки при хирургических вмешательствах на дыхательных путях и полости рта и в послеоперационном периоде;
3. Для лечения инфекций полости рта и горла, возникающих при химиотерапии;
4. При стрептококковых ангинах применяется как дополнительное средство при лечении антибиотиками.

Противопоказания.

- повышенная чувствительность к йоду и другим компонентам препарата;
- беременность и период кормления грудью;
- дети до 8 лет;
- нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз);
- сердечная недостаточность;
- герпетиформный дерматит Дюринга;
- одновременное применение радиоактивного йода.

Способ применения и дозы

Местно.

Снять защитный колпачок и установить аппликатор. Нажать 2-3 раза на аппликатор, чтобы раствор поступил в распылитель и после нажима разбрызгивался. После этого поместить трубку аппликатора на 2 - 3 см в полость рта, задержать дыхание и нажать два раза на колпачок так, чтобы одно орошение было осуществлено направо, а второе налево.

Использовать препарат Йокс® спрей рекомендуется 2 – 4 раза в день.

В случае необходимости, препарат можно применять и более часто, через каждые 4 часа.

Аппликатор перед применением и после него промывается горячей водой.

Побочное действие

Препарат Йокс® спрей обычно переносится хорошо.

В отдельных случаях возможны реакции повышенной чувствительности к препарату и проявление аллергической реакции на йод (зуд, гиперемия), что требует отмены препарата.

Длительное применение препарата может вызвать явление йодизма (в том числе: металлический вкус, повышенное слюноотечение, отеки глаз или гортани), при появлении которого следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременное применение препарата Йокс® с другими антисептическими средствами, предназначенными для местного применения в полости рта и глотки, особенно содержащие перекись водорода, в связи с инактивацией препарата.

Особые указания

Не предназначен для приема внутрь.

Не следует вдыхать или проглатывать препарат.

Форма выпуска

Спрей для местного применения.

По 30 мл во флаконы из ПЭ (полиэтилена) или из ПЭТ (полиэтилентерефталата), снабженные механическим распылителем и крышкой, предохраняющей распылитель. Каждый флакон в комплекте с аппликатором или аппликатором с поворотным рычагом помещен в картонную пачку с инструкцией по применению.

Условия хранения

При температуре от 10 °С до 25 °С в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Айвэкс Фармасьютикалс с.р.о., Чешская Республика

Остравска 29, 74770 Опава-Комаров

IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Ostravská 29, 74770 Opava-Komárov, Czech Republic

Адрес для приема претензий.

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2, Бизнес-центр «Конкорд»

тел./факс: +7(495)644-22-34/35/36

И.о. директора ИДКЭЛС



А.Н. Васильев

Представитель фирмы



О.А. Иванова