

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Департамента Государственного
контроля лекарственных средств и
медицинской техники МЗ РФ


Акимошкин В.Е.

12.05.2003

ОДОБРЕНО

Фармакологическим комитетом
МЗ РФ

«13» мая 2003 г

Протокол № 2

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для потребителей)
по медицинскому применению препарата
СТОПАНГИН

Регистрационный номер:

Торговое название: СТОПАНГИН

Лекарственная форма: раствор для местного применения

Состав:

Активные вещества: гексетидин 0,1 г; смесь эфирных масел (анисовое эфирное масло 36,45 мг, эвкалиптовое эфирное масло 1,05 мг, сассафрасное эфирное масло 8,4 мг, эфирное масло мяты перечной 60,6 мг, гвоздичное эфирное масло 8,4 мг); ментол 17,55 мг; метилсалицилат 17,55 мг.

Вспомогательные вещества: сахаринат натрия моногидрат, кислота лимонная, полисорбат 60, этанол 96%, краситель «Rubog ponceau 4R», вода очищенная.

Описание: прозрачная, светло-красного цвета жидкость со специфическим ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ: R02AA20

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Антисептическое средство для местного применения. Обладает также противогрибковой активностью и анальгетическими свойствами при нанесении на слизистую оболочку. Стопангин оказывает обволакивающее действие. Эффект продолжается 10 - 12 час.

ПОКАЗАНИЯ

- воспалительные заболевания полости рта и гортани (ангина, тонзиллит, фарингит, стоматит, афты, глоссит, пародонтоз и пародонтопатии, инфицирование альвеол);
- грибковые заболевания полости рта и гортани (молочница);
- до и после оперативных вмешательств, а также травмах полости рта и гортани;
- в качестве вспомогательного средства при комплексном лечении ангины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат не следует применять при повышенной чувствительности к компонентам препарата, при сухом фарингите атрофического типа, детям в возрасте до 8 лет, а также во время беременности (I триместр).

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Может появиться временное ощущение жжения слизистой ротовой полости после применения препарата, которое самопроизвольно быстро исчезает. В исключительных случаях у людей с повышенной чувствительностью может наступить аллергическая реакция. Случайное проглатывание препарата при полоскании может вызвать самостоятельно проходящую тошноту. В случае появления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Не известны.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Местно. Если врач не назначил иначе, рекомендуется 2-5 раз в день промывать полость рта (в течение не менее 30 секунд) неразбавленным раствором в объеме 10-15 мл (1 столовая ложка). Можно также смазывать слизистую оболочку полости рта с помощью ватного тампона на палочке. Этот способ применения целесообразно применять у детей.

Перерыв между процедурами должен быть не менее 4 часов.

Препарат следует применять после еды или в промежутках между приемами пищи в течение 6-7 дней.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат могут применять подростки, а также беременные (2 и 3 триместр) и кормящие грудью женщины.

Дети могут применять препарат лишь с такого возраста, когда нет опасности неконтролируемого проглатывания препарата.

О целесообразности одновременного применения препарата "Стопангин" с другими лекарствами посоветуйтесь с врачом.

При назначении врачом других лекарств, сообщите ему о применении "Стопангина".

В случае ухудшения самочувствия, повышения температуры, неэффективности проведения лечебных процедур или появления необычных реакций следует обратиться к врачу.

При передозировке или в случае приема препарата внутрь ребенком, необходимо посоветоваться с врачом.

Препарат содержит 4% спирта (этанола).

Вниманию автоводителей:

Препарат следует принимать не позднее, чем за 30 минут до начала управления автотранспортным средством.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы по 100 мл из темного стекла. Каждый флакон помещен в картонную коробку вместе с инструкцией по медицинскому применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Список Б. При температуре от 10°C до 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

4 года.

Не следует применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АЙВЭКС – ЧР а.с., Чешская Республика

Входит в состав IVAХ Corporation, США

Московское представительство

АЙВЭКС А.С. (ранее ГАЛЕНА А.С.) Чехия

Москва, 103031, Дмитровский пер., дом 9,


тел. 234 97 13

Медицинский директор

Московского представительства

АЙВЭКС А.С., Чехия

Директор ИДКЭЛС, профессор



М.Ю. Вильчинская

В.В. Чельцов